

SCHEMAT OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ DZIECI I MŁODZIEŻY

I. Szczepienie podstawowe

Szczepienie	Liczba dawek	Wiek, w którym powstaje obowiązek szczepienia	Termin wykonania szczepienia
przeciw gruźlicy	– schemat jednodawkowy	pojedyncza dawka – w 1 dobie życia	przed wypisem ze szpitala
przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B	– schemat 3-dawkowy w przypadku szczepionki nieskojarzonej (0, 1, 6 miesięcy) lub szczepienia dzieci urodzonych po 37 tygodniu ciąży z masą urodzeniową powyżej 2000 g	1. dawka – w 1 dobie życia 2. dawka – od ukończenia 6. tygodnia życia 3. dawka – od ukończenia 6. miesiąca życia	24 godziny po urodzeniu w 2. miesiącu życia w 7. miesiącu życia
	– schemat 4-dawkowy (0, 1, 2, 12 miesięcy) w przypadku szczepionki typu 6-w-1 lub szczepienia dzieci z masą urodzenia w poniżej 2000 g, lub dzieci urodzonych przed 37. tygodniem ciąży	1. dawka – w 1 dobie życia 2. dawka – 1 miesiąc po pierwszej dawce 3. dawka – 1 miesiąc po drugiej dawce 4. dawka – od ukończenia 6. miesiąca życia	przed wypisem ze szpitala w 2. miesiącu życia w 3. miesiącu życia w 7–12. miesiącu życia
	schemat 3-dawkowy – szczepienia dzieci urodzonych po 37. tygodniu ciąży	1. dawka – od ukończenia 6. tygodnia życia 2. dawka – po upływie 8. tygodni od pierwszej dawki 3. dawka – od ukończenia 12. miesiąca życia po upływie co najmniej 6 miesięcy od drugiej dawki	w 2. miesiącu życia w 4. miesiącu życia w 13–15. miesiącu życia
przeciw inwazyjnym zakażeniom <i>Streptococcus pneumoniae</i>	schemat 4-dawkowy – szczepienia dzieci urodzonych przed 37. tygodniem ciąży	1. dawka – od ukończenia 6. tygodnia życia	w 2. miesiącu życia

			<p>2. dawka – po upływie 4 tygodni od pierwszej dawki</p> <p>3. dawka – po upływie 4 tygodni od drugiej dawki</p> <p>4. dawka – co najmniej 6 miesięcy od drugiej dawki</p>	<p>w 3–4. miesiącu życia</p> <p>w 5–6. miesiącu życia</p> <p>w 13–15. miesiącu życia</p>
<p>przeciw ostremu nagminnemu porażeniu dziecięcemu (<i>poliomyelitis</i>)</p>	<p>schemat 3-dawkowy – w przypadku szczepienia szczepionką, dla której Charakterystyka Produktu Leczniczego określa 3-dawkowy schemat szczepienia</p>	<p>1. dawka – od ukończenia 12. tygodnia życia</p>	<p>w 4. miesiącu życia</p>	
		<p>2. dawka – po upływie 8 tygodni od pierwszej dawki</p>	<p>w 6. miesiącu życia</p>	
		<p>3. dawka – od ukończenia 15 miesiąca życia</p>	<p>w 16–18. miesiącu życia</p>	
<p>przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi</p>	<p>schemat 4-dawkowy – w przypadku szczepienia szczepionką, dla której Charakterystyka Produktu Leczniczego określa 4-dawkowy schemat szczepienia</p>	<p>1. dawka – od ukończenia 6. tygodnia życia</p>	<p>w 2. miesiącu życia</p>	
		<p>2. dawka – od ukończenia 14. tygodnia życia</p>	<p>w 4. miesiącu życia</p>	
		<p>3. dawka – od ukończeniu 5. miesiąca życia</p>	<p>w 6–7. miesiącu życia</p>	
		<p>4. dawka – od ukończenia 15. miesiąca życia</p>	<p>w 16–18. miesiącu życia</p>	
<p>przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi</p>	<p>schemat 4-dawkowy</p>	<p>1. dawka – od ukończenia 6. tygodnia życia</p>	<p>w 2. miesiącu życia</p>	
		<p>2. dawka – po upływie 8 tygodni od pierwszej dawki</p>	<p>w 4. miesiącu życia</p>	
		<p>3. dawka – po upływie 8 tygodni od drugiej dawki</p>	<p>w 6. miesiącu życia</p>	
		<p>4. dawka – od ukończenia 15. miesiąca życia</p>	<p>w 16–18. miesiącu życia</p>	
<p>przeciw rotawirusom</p>	<p>schemat 3-dawkowy – w przypadku szczepienia szczepionką, dla której Charakterystyka Produktu Leczniczego określa 3-dawkowy schemat szczepienia</p>	<p>1. dawka – od ukończenia 6. tygodnia życia</p>	<p>w 2. miesiącu życia</p>	
		<p>2. dawka – po upływie 4 tygodni od pierwszej dawki</p>	<p>w 4. miesiącu życia</p>	

			3. dawka – po upływie 4 tygodni od drugiej dawki	w 5–6. miesiącu życia
		schemat 2-dawkowy – w przypadku szczepienia szczepionką, dla której Charakterystyka Produktu Leczniczego określa 2-dawkowy schemat szczepienia	1. dawka – od ukończenia 6. tygodnia życia 2. dawka – po upływie 4 tygodni od pierwszej dawki	w 2. miesiącu życia w 4. miesiącu życia
		schemat 4-dawkowy	1. dawka – od ukończenia 6. tygodnia życia 2. dawka – po upływie 8 tygodni od pierwszej dawki 3. dawka – po upływie 8 tygodni od drugiej dawki 4. dawka – od ukończenia 15. miesiąca życia	w 2. miesiącu życia w 4. miesiącu życia w 6. miesiącu życia w 16–18. miesiącu życia
		schemat 1-dawkowy	pojedyncza dawka – od ukończenia 12. miesiąca życia	w 13–15. miesiącu życia
przeciw inwazyjnym zakażeniom <i>Haemophilus Influenzae</i> typu b				
przeciw odrze, na gminnemu zapaleniu przyusznic (świniec), różyczce				

II. Szczepienia przypominające

Szczepienie	Osoby objęte obowiązkiem poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym	Dawki szczepionki i wiek, w którym są podawane	Termin wykonania szczepienia
przeciw ostremu nagminnemu porażeniu dziecięcemu (<i>poliomyelitis</i>)	od ukończenia 5. roku życia do ukończenia 6. roku życia	pojedyncza dawka – od ukończenia 5. roku życia przez osobę, u której wykonano szczepienie podstawowe	do ukończenia 6. roku życia
przeciw odrze, nagminnemu zapaleniu przyusznic (świniec), różyczce	od ukończenia 5. roku życia do ukończenia 6. roku życia	pojedyncza dawka – po ukończeniu 5. roku życia przez osobę, u której wykonano szczepienie podstawowe	do ukończenia 6. roku życia
przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi	od ukończenia 5. roku życia do ukończenia 6. roku życia	pojedyncza dawka – po ukończeniu 5. roku życia przez osobę, u której wykonano szczepienie podstawowe	do ukończenia 6. roku życia
	od ukończenia 13. roku życia do ukończenia 14. roku życia	pojedyncza dawka – po ukończeniu 13. roku życia przez osobę, u której wykonano pierwsze szczepienie przypominające	do ukończenia 14. roku życia
przeciw błonicy i tężcowi	od ukończenia 18. roku życia do ukończenia 19. roku życia	pojedyncza dawka – po ukończeniu 18. roku życia przez osobę, u której wykonano drugie szczepienie przypominające	do ukończenia 19. roku życia